

# #EVOLUCI<sup>ON</sup>



VIII Congreso Nacional de Alzheimer. Huesca - 14, 15 y 16 de noviembre de 2019

## “Trastornos de conducta en personas con demencia.”

Autores: Ignacio Gimeno Millán; María Jesús Cardoso Moreno



# INTRODUCCIÓN



# HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

## Hipótesis

- ¿Existe relación entre la presencia de trastornos de conducta en personas con demencia, y la aparición de sobrecarga en el cuidador principal informal?

## Objetivo principal

- Analizar si la manifestación de trastornos de conducta por parte de las personas con demencia, está relacionada con la presencia de sobrecarga en el cuidador principal informal.

## Objetivos secundarios

1. Identificar si la sobrecarga del cuidador, y la presencia de trastornos de conducta en el usuario, influyen en el riesgo de aparición de conductas de malos tratos por parte del cuidador hacia la persona con demencia.

2. Analizar la variabilidad de los trastornos de conducta manifestados por los usuarios con demencia, el nivel de sobrecarga en el cuidador, y el riesgo de maltrato del cuidador hacia el usuario, en función de los diferentes estadios evolutivos de la demencia.

3. Detectar si existe variación, y de qué manera, en la aparición de los diferentes trastornos de conducta detectados en los usuarios con demencia, en función de las diferentes formas de la enfermedad incluidas en el presente estudio.

# METODOLOGÍA

## Muestra


- 33 cuidadores informales de usuarios con demencia.
- Zona Básica de Salud de Casetas: La Joyosa, Marlofa, Sobradriel, Torres de Berrellén, Pinseque.

## Instrumentos

- Escala de Zarit (Sobrecarga del cuidador).
- Escala FAST (Deterioro funcional del usuario).
- Escala CASE (Riesgo de abuso por el cuidador).
- Entrevista estructurada/Cuestionario de trastornos de conducta.
- Cuestionario personal.

# RESULTADOS

## Análisis descriptivo de la muestra



# RESULTADOS

## Sobrecarga

### Trastornos de conducta

Excepto:

Pasividad ( $p=0,413$  NS)  
Vocalizaciones repetidas  
( $p=0,399$  NS)

Agresividad ( $r=0,669$  y  $p=0,000$ )  
Irritabilidad ( $r=0,624$  y  $p=0,000$ )

## Riesgo de malos tratos

### Sobrecarga

( $r= 0,844$  y  $p=0,000$ )

### Trastornos de conducta

Excepto: Apatía ( $p=0,212$  NS)  
Pasividad ( $p=0,206$  NS) y  
Vocalizaciones repetidas  
( $p=0,198$  NS)

Agresividad ( $r=0,824$  y  $p=0,000$ )  
Irritabilidad ( $r=0,845$  y  $p=0,000$ )

# RESULTADOS

Varianza de la sobrecarga en los diferentes estadios de la demencia (F=15,70 y p=0,000)

Estadio de la demencia	Media	Desviación típica
Leve o inicial	31,85	18,77
Moderado o intermedio	43,90	17,61
Grave o final	27,66	10,55

Estadio de la demencia	Cuidador	
Leve o inicial	No sobrecarga(%)	71,4%
	Sobrecarga(%)	14,3%
	Sobrecarga intensa(%)	14,3%
Moderado o intermedio	No sobrecarga(%)	40,0%
	Sobrecarga(%)	35,0%
	Sobrecarga intensa(%)	25,0%
Grave o final	No sobrecarga(%)	83,3%
	Sobrecarga(%)	16,7%
	Sobrecarga intensa(%)	00,0%

# RESULTADOS


Varianza del riesgo de abuso en los diferentes estadios de la demencia (F=10,11 y p=0,003)

Estadio de la demencia	Media	Desviación típica
Leve o inicial	3,00	3,36
Moderado o intermedio	4,70	2,86
Grave o final	0,66	1,20

Estadio de la demencia	Cuidador	
Leve o inicial	Riesgo maltrato(%)	42,9%
	No riesgo de maltrato (%)	57,1%
Moderado o intermedio	Riesgo maltrato(%)	70,0%
	No riesgo de maltrato (%)	30,0%
Grave o final	Riesgo maltrato(%)	00,0%
	No riesgo de maltrato (%)	100%




# RESULTADOS




# RESULTADOS

Trastornos de conducta en los diferentes estadios



# RESULTADOS

## Trastornos de conducta en las diferentes demencias



# DISCUSIÓN

- Cuidado ejercido exclusivamente por el cuidador informal, en una población que linda entre el ámbito rural y urbano.

•Redes de apoyo ausentes o insuficientes  
•Situaciones familiares verdaderamente complejas  
•Difícil localización y acceso



Intervención

- Los trastornos conductuales son el aspecto que mayor sobrecarga genera, y cuya presencia se vincula también con el riesgo de abuso o malos tratos hacia el usuario.

•Se acentúa en el contexto del cuidado informal  
•Mayor vulnerabilidad

# DISCUSIÓN

- Algunos estudios vinculan la sobrecarga y riesgo de malos tratos al incremento de la dependencia generados por el avance de la demencia.



Estadio final

- En el presente estudio, sobrecarga y riesgo de malos tratos se han vinculado más a la presencia de trastornos conductuales.



Estadio  
intermedio

“A mí lo que me estresa, no es el hecho de dar de comer o tener que duchar a mi padre, si no que me insulte, o que todo le haga estar enfadado”

# DISCUSIÓN

## Limitaciones

- Escasez de muestra.
- Ausencia de un seguimiento del cuidador y usuario.
- No se contempló el sexo como variable.

## Líneas de investigación

- Influencia del estadio y etiología de la demencia en los trastornos conductuales.
- Efecto de las enfermedades incapacitantes en el cuidador.
- Importancia del cuidado del cuidador.


# CONCLUSIONES

## Objetivo principal

Analizar si la manifestación de trastornos de conducta por parte de las personas con demencia, está relacionada con la presencia de sobrecarga en el cuidador principal informal.

## Conclusión

La presencia de trastornos conductuales (excepto pasividad y vocalizaciones repetidas) incrementaron la sobrecarga del cuidador principal informal.



Agresividad  
Irritabilidad  
Desinhibición

# CONCLUSIONES

1-Trastornos de conducta y sobrecarga, en la aparición de riesgo de malos tratos

- Sobrecarga y trastornos de conducta (excepto apatía, pasividad, y vocalizaciones repetidas), incrementaron el riesgo de abuso o malos tratos.

2-Trastornos de conducta, sobrecarga, y riesgo de maltrato, en los diferentes estadios

- Mayor frecuencia en el estadio intermedio de la demencia, alcanzando sus niveles más bajos en los estadios finales de la enfermedad.

3-Trastornos de conducta en las diferentes formas de demencia

- Depresión, decaimiento y pasividad en la Enfermedad de Parkinson.
- Apatía y vocalizaciones repetidas en la Enfermedad de Alzheimer.
  - Irritabilidad en la Demencia Mixta.